

Guía Informativa de Clamidia:

Síntomas, tratamiento y recursos

1. ¿Que es clamidia?

Clamidia es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) muy común. Usted puede tener la infección en la vagina, pene, ano o garganta. La mayoría de las personas con clamidia no tiene signos ni síntomas. Cuando las personas tienen síntomas, pueden ser leves al principio. Pueden aparecer inmediatamente o presentarse 30 días después de tener relaciones sexuales con alguien que tiene clamidia



Usted puede tener algunos de estos síntomas:

- Dolor o ardor al orinar (pee)
- Secreciones de la vaginal, del pene, o ano con un olor o apariencia extraña
- Fiebre
- Sangrado vaginal durante o después del sexo
- Dolor en la parte baja del abdomen, espalda o ano, sobre todo al tener sexo (para mujeres)
- Dolor en el pene, testículos o ano, especialmente al tener sexo (para el hombre)



2. ¿Es clamidia una enfermedad seria?

Si. Usted debe ver a un médico si piensa que tienes clamidia.

Si usted no recibe tratamiento, puede:

- Transmitir la clamidia a las persona con las que tiene relaciones sexuales
- Contraer más fácilmente otras enfermedades, como el VIH
- Tener problemas para quedar embarazada
- Transmitir esta infección al bebé durante el parto
- Tener dolor en el parte baja del abdomen al tener sexo (para mujeres) el sexo
- Tener un embarazo que crece fuera del útero, esto puede causar la muerte
- Dolor o hinchazón en los testículos

3. ¿Cómo se transmite la clamidia?

Usted puede contraer clamidia al tener sexo vaginal, anal, u oral con alguien que este infectado. La mayoría de las personas no saben que tienen esta infección porque no tienen síntomas. Con solo mirar a una persona usted no puede saber si está infectada. Solo haciéndose una prueba es la única manera de saber si usted tiene clamidia.

4. ¿Qué hacer si tengo clamidia?

Siga estos 3 pasos importantes para curar la clamidia:

1. Tome todo el medicamento que el médico o la enfermera le recetaron. No comparta sus medicamentos con nadie a menos que el médico o la enfermera se lo indiquen.
2. Asegúrese de que su pareja (s) sexual de los últimos 2 meses reciba el tratamiento para clamidia tan pronto como sea posible.
3. No tener relaciones sexuales hasta 7 días después de que ambos, usted y su pareja sexual hayan terminado el tratamiento. Use un condón si tiene sexo antes de los 7 días.

Si usted no sigue todos estos pasos, puede contraer clamidia otra vez y esto puede ser peor.

-STD-0022-01 (12/08/16)

5. ¿Qué debo saber acerca de mi tratamiento?

No tenga relaciones sexuales hasta **7 días** después que usted y su pareja sexual hayan terminado la medicina.

Le han dado la medicina que se indica a continuación:

<input type="checkbox"/>	Azithromycin: Tome toda la medicina a la vez, tan pronto como se la den
<input type="checkbox"/>	Doxycycline: <ul style="list-style-type: none">- Tomar 1 pastilla en la mañana y 1 pastilla por la noche por 7 días- No tome este medicamento si usted piensa que puede estar embarazada- Tome este medicamento con comida o leche si tiene malestar estomacal- Usted puede ser fácilmente bronceado por el sol mientras toma este medicamento

6. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento?

Llame al 911 inmediatamente si tiene un silbido o dificultad para respirar. Llame a la clínica si usted tiene una erupción en la piel, granos, picazón o un vomito sin parar.

7. ¿Mi pareja(s) sexual debe recibir también tratamiento?

Si. Hay muchas maneras para asegurarse de que su pareja sexual pueda conseguir medicamentos para clamidia:

- Cuando usted venga a su tratamiento, traiga su pareja a la clínica
- Pregunte al doctor o enfermera si le pueden dar más medicina para su pareja
- Pídale a su pareja que visite a su médico para obtener un tratamiento adecuado
- Visite www.inspot.org para enviar un correo electrónico anónimo diciendo que su pareja tiene clamidia

8. ¿Que si estoy embarazada y tengo Clamidia?

Si piensa que está embarazada, dígame al **doctor o enfermera antes de tomar algún medicamento**. Dígame al doctor que está viendo para su embarazo que el examen de Clamidia resulto positivo. Si mantiene el embarazo, debe hacerse la prueba nuevamente en 3 a 4 semanas para asegurarse de que usted ha sido curada de Clamidia. Si usted no reciba tratamiento, la clamidia puede ser transmitida a su bebé, y causar serias infecciones de los ojos o de pulmón.

9. ¿Puedo contraer clamidia más de una vez?

Si. El haber tenido clamidia no le impide infectarse otra vez.

Infectarse con clamidia otra vez puede causar otras infecciones y ser mucho más severo para su cuerpo.

Usted puede infectarse si:

- Tiene sexo con alguien que no recibió tratamiento
- Tiene relaciones sexuales demasiado pronto después de que usted y su pareja sexual terminaran el tratamiento
- Tiene relaciones sexuales con una nueva pareja que tiene clamidia

La mayoría de las veces no hay síntomas cuando alguien tiene clamidia otra vez. Es recomendable regresar a la clínica si los síntomas no desaparecen en unos pocos días. Use un condón cada vez que tenga sexo, para evitar infectarse otra vez.

Llame a la línea de ETS para recursos e información sobre pruebas de bajo costo y condones: 800-758-0880

Si usted tuvo clamidia debe hacerse la prueba otra vez en 3 meses.